





# 服用薬品名カード

平成26年07月30日

Page: 1

薬の名前・記号	色	形	起	朝	昼	夕	寝	用法・効能・注意・他
サルボグレラート塩酸 塩錠100mg「サワ」  SW SPT:100 SW-SPT100:100mg   直径 8.6 mm 厚さ 4.2 mm  薬価：77.8円 この薬は後発品です	白	錠剤		1	1	1		(1日3回 毎食後服用) 用量 3錠(1日分)×43日分 1回 1錠 この薬は血を固まりにくくし、流れをよくする作用があります。 【品質情報】 標準品はアンブラグ錠100mgです。 効能・効果及び用法・用量は標準品と同じです。標準品との品質の同等性は試験によって確認されています。
(局)プレドニン錠5mg  341:5 5mg:5mg 341 5 うすい橙色の素錠    薬価：9.6円 この薬には後発品がありません	薄橙	錠剤		1/2				(1日1回 朝食後服用) 用量 0.5錠(1日分)×43日分 1回 1/2錠 この薬は副腎皮質ホルモンの不足を補います。 この薬はアレルギーを抑制する作用があります。 この薬は炎症を鎮める作用があります。 ★胃障害、食欲亢進、不眠、気分の変動、顔が丸くなる、感染症にかかりやすくなるなどの症状が出ることもあるが、薬を中止することでおさまります。 ★血圧上昇、血糖値上昇、骨がもろくなる、白内障、緑内障にかかりやすくなることがあります。
テプレノンカプセル50mg「トーフ」  Tw403 50mg:50mg Tw403 50   全長 14.2 mm  薬価：6.8円 この薬は後発品です	灰青緑 /淡橙	カプセル剤		1		1		(1日2回 朝・夕食後服用) 用量 2Cap(1日分)×43日分 1回 1Cap この薬は荒れた胃の粘膜を修復する作用があります。 【品質情報】 標準品はセルベックスカプセル50mg(一般名:テプレノン)です。 効能・効果及び用法・用量は標準品と同じです。標準品との品質の同等性は試験によって確認されています。
アゼルニジピン錠16mg「日医工」  n 433:16 16mg 433:16mg   直径 9.1 mm 厚さ 4.1 mm	淡黄白	錠剤		1				(1日1回 朝食後服用) 用量 1錠(1日分)×43日分 1回 1錠 この薬は末梢の血管を拡張して血圧を下げる作用があります。 【品質情報】 標準品はカルブロック錠16mgです。 効能・効果及び用法・用量は標準品と同じです。標準品との品質の同等性は試験によって確認されています。 ★この薬はグレープフルーツジュースと同時に服用しないでください。

後発品に関する情報は、薬剤師にお問い合わせください

# 服用薬品名カード

平成26年07月30日

Page: 2

薬の名前・記号	色	形	起	朝	昼	夕	寝	用法・効能・注意・他
<p>薬価：34.2円 この薬は後発品です</p> <p>ディオバン 80mg</p> <p>N V:134 NOVARTIS 80mg:NOVART</p>  <p>直径 8.6 mm 厚さ 3.7 mm</p> <p>薬価：109.1円 当薬局には後発品の在庫がありません</p>	白	錠剤		1			1	<p>(1日2回 朝・夕食後服用)</p> <p>用量 2錠(1日分)×43日分 1回 1錠</p> <p>血管を広げて血圧を下げる作用があります。</p> <p>★めまい、ふらつきを起こすことがありますので、高所作業、自動車の運転等危険をとまなう機械の操作には注意してください。</p>
<p>フルイトラン錠 2mg</p> <p>S: 2:S 2</p>  <p>直径 8.0 mm 厚さ 2.5 mm</p> <p>薬価：9.6円</p> <p>【後発品】トリクロルメチアジド錠 2mg 「日医工」 薬価：6.1円</p>	淡赤	錠剤		1/4				<p>(1日1回 朝食後服用)</p> <p>用量 0.25錠(1日分)×43日分 1回 1/4錠</p> <p>利尿剤。血圧を下げ、むくみをとります。</p> <p>この薬は尿を出して身体のむくみをとる作用があります。</p> <p>★めまい、ふらつきを起こすことがありますので、高所作業、自動車の運転等危険をとまなう機械の操作には注意してください。</p>
<p>ニフェジンL錠 20mg 「日医工」</p> <p>n 299:20 299 -L20 20:20 mg</p>  <p>直径 6.1 mm 厚さ 2.9 mm</p> <p>薬価：5.8円 この薬は後発品です</p>	淡赤	錠剤					1	<p>(1日1回 夕食後服用)</p> <p>用量 1錠(1日分)×43日分 1回 1錠</p> <p>この薬は心臓へ酸素や栄養を送っている冠血管を拡張させる作用があります。</p> <p>この薬は末梢の血管を拡張して血圧を下げる作用があります。</p> <p>。グレープフルーツジュースによって薬の作用が強まることがありますので、同時に飲むのは避けてください。</p> <p>めまい等があらわれることがありますので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には注意してください。</p>

後発品に関する情報は、薬剤師にお問い合わせください


薬の名前・記号	色	形	起	朝	昼	夕	寝	用法・効能・注意・他
<p>ネキシウムカプセル20mg</p> <p>AZネキシウム20:20mg</p>  <p>薬価：160.1円 この薬には後発品がありません</p>	濃青／極薄黄赤	カプセル剤				1		<p>(1日1回 夕食後服用)</p> <p>用量 1Cap(1日分)×43日分 1回 1Cap</p> <p>胃酸の分泌を抑えます。</p> <p>胃潰瘍、十二指腸潰瘍、食道炎の治療に用います。</p>
<p>アレンドロン酸錠35mg「マイラン」</p> <p>M:35 M127</p>  <p>薬価：314.7円 この薬は後発品です</p>	白	錠剤	1					<p>(1日1回 起床時服用)</p> <p>用量 1錠(1日分)×6日分 1回 1錠</p> <p>この薬は骨の代謝を改善し、骨がもろくなるのを予防する作用があります。</p> <p>【品質情報】</p> <p>標準品はボナロン錠35mgです</p> <p>効能・効果及び用法・用量は標準品と同じです。標準品との品質の同等性は試験によって確認されています。</p> <p>1週間に1回、朝起床してすぐにコップ1杯の水(約180mL)で服用してください。水以外の飲み物(カルシウムやマグネシウムなどの含量の特に高いミネラルウォーターを含む)、食物および他の薬剤と一緒に服用す★この薬を服用中に歯科治療を受ける場合は、この薬を服用していることを歯科・口腔外科医師にお知らせください。</p> <p>日曜日に服用</p>
<p>バイアスピリン錠100mg</p> <p>BA 100: 100 BA100:</p>  <p>薬価：5.6円 この薬は後発品です</p>	白	錠剤	1					<p>(1日1回 朝食後服用)</p> <p>用量 1錠(1日分)×43日分 1回 1錠</p> <p>この薬は血を固まりにくくすることで、血液の流れをよくする作用があります。</p> <p>★抜歯や手術をする予定のある方は医師にお知らせください。</p>

後発品に関する情報は 薬剤師にお問い合わせください

## 服用薬品名カード

平成26年07月30日


Page: 4

薬の名前・記号	色	形	起	朝	昼	夕	寝	用法・効能・注意・他
フェロ・グラデュメット錠105mg  : 105mg:105mg    薬価：9.2円 この薬には後発品がありません	赤	錠剤					1	(1日1回 寝る前服用) 用量 1錠(1日分)×43日分 1回 1錠 この薬は体内の鉄分の不足を補い、貧血を改善する作用があります。 ★便秘、吐き気、むかつき、便が黒くなるなどの症状があらわれることがあります。

## 服用薬品名カード

平成26年07月30日

Page: 5

薬の名前・記号	色	形	起	朝	昼	夕	寝	用法・効能・注意・他
(局)チラーヂンS錠100μg  TZ 234:100 TZ234 100μg:100μg    薬価：11.4円 この薬には後発品がありません	黄	錠剤					1	(1日1回 朝食後服用) 用量 1錠(1日分)×43日分 1回 1錠 甲状腺ホルモンの不足を補います。 薬の服用を忘れたときは、思い出した時すぐに服用してください。ただし、次の服用時間が近いときは忘れた分は服用しないで、その後は指示された時間から服用してください。飲み忘れたからといって一度に2回分を服用しないでください。