

服用薬品名カード

平成27年07月01日 Page: 1

処方医  
薬局名  
薬剤師名




薬の名前・記号	色	形	起	朝	昼	夕	夜	用法・効能・注意・他
サルボグラート塩酸塩錠100mg「サワ」 SW SPT:100 SW-SPT100:100mg 	白	錠剤	1	1	1			(1日3回 毎食後服用) 用量 3錠(1日分)×36日分 1回 1錠 この薬は血を固まりにくくし、流れをよくする作用があります。 【品質情報】 標準品はアンブララダ錠100mgです。 効能・効果及び用法・用量は標準品と同じです。標準品との品質の同等性は試験によって確認されています。
薬価: 77.8円 この薬は後発品です								
バイアスピリン錠100mg BA 100: 100 BA100: 	白	錠剤	1					(1日1回 朝食後服用) 用量 1錠(1日分)×36日分 1回 1錠 この薬は血を固まりにくくすることで、血液の流れをよくする作用があります。 ★歯痛や手術をする予定のある方は医師にお知らせください。
薬価: 5.6円 この薬は後発品です								
(馬)ブレドニン錠5mg 341:5 5mg:5mg 341 5 うすい橙色の素錠 	薄橙	錠剤	*					(1日1回 朝食後服用) 用量 1.5錠(1日分)×36日分 1回 1.5錠 この薬は副腎皮質ホルモンの不足を補います。 この薬はアレルギーを抑制する作用があります。 この薬は炎症を鎮める作用があります。 ★胃障害、食欲亢進、不眠、気分の変動、顔が赤くなる、感染症にかかりやすくなるなどの症状が出る場合があります。 ★血圧上昇、血糖値上昇、骨がもろくなる、白内障、緑内障にかかりやすくなる場合があります。
薬価: 9.6円 この薬には後発品がありません								
トリクロルメチアジド錠2mg「日医工」 2CN: 2mg 2CN:2mg 	桃	錠剤	1/4					(1日1回 朝食後服用) 用量 0.25錠(1日分)×36日分 1回 1/4錠 利尿剤。血圧を下げる、むくみをとります。 この薬は尿を出して身体のむくみをとる作用があります。 この薬は生理前の緊張をやわらげる作用があります。 【品質情報】 標準品はフルトラン錠2mg(一般名:トリクロルメチアジド)です。 効能・効果及び用法・用量は標準品と同じです。標準品との品質の同等性は試験によって確認されています。 ★めまい、ふらつきを起すことがありますので、高所作業、自動車の運転等危険をともなう機械の操作には注意してください。
薬価: 6.1円								

後発品に関する情報は、薬剤師にお問い合わせください

服用薬品名カード

平成27年07月01日 Page: 2

処方医  
薬局名  
薬剤師名


薬の名前・記号	色	形	起	朝	昼	夕	夜	用法・効能・注意・他
この薬は後発品です								ださい。
テブレノンカプセル50mg「トーワ」 Tw403 50mg:50mg Tw403 50 	灰青緑 /淡橙	カプセル剤	1	1				(1日2回 朝・夕食後服用) 用量 2カプセル(1日分)×36日分 1回 1カプセル この薬は荒れた胃の粘膜を修復する作用があります。 【品質情報】 標準品はセルベックスカプセル50mg(一般名:テブレノン)です。 効能・効果及び用法・用量は標準品と同じです。標準品との品質の同等性は試験によって確認されています。
薬価: 6.8円 この薬は後発品です								
バルサルタン錠80mg「サンド」 V L:80 VL80 80mg:80mg 	白	錠剤	1	1				(1日2回 朝・夕食後服用) 用量 2錠(1日分)×36日分 1回 1錠 血圧を上げる物質の働きをおさえることによって、末梢の血管を拡張して、血圧を下げる作用があります。 【品質情報】 標準品はディオバン錠80mgです。 効能・効果及び用法・用量は標準品と同じです。標準品との品質の同等性は試験によって確認されています。 ★めまい、ふらつきを起すことがありますので、高所作業、自動車の運転等危険をともなう機械の操作には注意してください。
薬価: 54.6円 この薬は後発品です								
アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」 M:35 M127 	白	錠剤	1					(1日1回 起床時服用) この薬は骨の代謝を改善し、骨がもろくなるのを予防する作用があります。 【品質情報】 標準品はドレネ錠35mgです。 効能・効果及び用法・用量は標準品と同じです。標準品との品質の同等性は試験によって確認されています。 1週間に1回、朝起床してすぐにコップ1杯の水(約180mL)で服用してください。水以外の飲み物(カルシウムやマグネシウムなどの含有量の高いミネラルウォーターを含む)、食物および他の薬剤と一緒に服用すると吸収されにくくなるので、避けてください。 授乳中の方は、飲み始める前に医師にお知らせください。 日曜日
薬価: 314.7円 この薬は後発品です								

後発品に関する情報は、薬剤師にお問い合わせください

服用薬品名カード

平成27年07月01日 Page: 3

処方医  
薬局名  
薬剤師名

薬の名前・記号	色	形	起	朝	昼	夕	夜	用法・効能・注意・他
ニフェジピン錠20mg「日医工」 n 299:20 299 -L20 20:20 mg 	淡赤	錠剤	1					(1日1回 夕食後服用) 用量 1錠(1日分)×36日分 1回 1錠 この薬は心臓へ酸素や栄養を送っている冠血管を拡張させる作用があります。 血圧を下げるお薬です。 グレープフルーツジュースによって薬の作用が強まることがありますので、同時に飲むのは避けてください。 ★めまい等があらわれることがありますので、高所作業、自動車の運転等危険を伴う機械の操作には注意してください。
薬価: 5.8円 この薬は後発品です								

後発品に関する情報は、薬剤師にお問い合わせください

服用薬品名カード

平成27年07月01日 Page: 4

処方医  
薬局名  
薬剤師名

薬の名前・記号	色	形	起	朝	昼	夕	夜	用法・効能・注意・他
(馬)テラゼンS錠100μg TZ 234:100 TZ234 100μg:100μg 	黄	錠剤	1					(1日1回 朝食後服用) 用量 1錠(1日分)×98日分 1回 1錠 甲状腺ホルモン不足を補います。 薬の服用を忘れたときは、思い出した時すぐに服用してください。ただし、次の服用時間が近いときは忘れた分は服用しないで、その後は指示された時間から服用してください。飲み忘れたからといって2回分に服用しないでください。
薬価: 11.4円 この薬には後発品がありません								

後発品に関する情報は、薬剤師にお問い合わせください

患者番号  
氏名

生年月日  
性別 女

出力日時：2015-07-01

14:47

	整形外科	整形外科	整形外科	腎臓内	呼吸器	腎臓内	腎臓内	
	2015-04-19	2015-04-20	2015-04-22	2015-05-15	2015-06-04	2015-06-04	2015-07-01	
NAG尿				H 18.6		10.6	9.2	0.3~11.5 IU/L
CRE尿				241.40		21.17	22.32	mg/dl
β2M尿				H 680		H 602	H 1046	0~308 μg/L
TP		L 6.2	L 6.3	7.1	7.8	7.9	7.9	6.5~8.0 g/dl
ALB	L 2.2	L 2.3	L 2.3	L 3.1		L 3.7	L 3.7	4.0~5.0 g/dl
TTT				H 30.2		H 36.5	H 37.2	1.0~8.6 U
ZTT				H 26.1		H 29.5	H 31.2	4.0~12.0 U
AST	25	30	19	17	22	21	22	10~35 U/L
ALT	L 5	10	8	9	14	13	13	7~42 U/L
LDH		H 342	226	206	202	202	186	120~240 U/L
ALP		175	152	229	229	222	218	110~360 U/L
CRE	H 0.91	H 0.81	0.80	H 0.93	H 0.88	H 0.89	H 0.97	0.45~0.80 mg/dl
UA				H 7.5		H 7.8	H 8.3	2.5~7.0 mg/dl
UN	H 26	19	14	18	17	17	20	8~22 mg/dl
TG				H 220		H 227	H 304	40~150 mg/dl
Na	138	140	140	143		140	141	138~146 mEq/L
K	3.9	3.7	3.8	3.7		3.9	4.0	3.6~4.9 mEq/L
Ca				L 8.1		8.8	8.7	8.7~10.3 mg/dl
IgG				H 2328			H 2514	870~1,700 mg/dl
IgA							246	110~410 mg/dl
IgM							94	46~260 mg/dl
CRP (定量)	H 19.73	H 12.21	H 6.56	H 0.42	0.23	0.23	H 0.54	0.00~0.30 mg/dl
WBC		H 10.6	6.7	8.1	H 10.0	H 10.3	H 9.9	3.5~8.5 x10 <sup>3</sup> /μl
Hgb		L 10.6	L 10.7	L 11.4	11.5	11.6	12.2	11.5~14.5 g/dl
PLT		170	226	L 135	L 140	L 147	150	150~350 x10 <sup>3</sup> /μl
尿蛋白				H (±)		(-)	(-)	(-)
尿蛋白定量				15.4		1.7	2.3	mg/dl
尿糖				(-)		(-)	(-)	(-)
尿潜血				(-)		(-)	(-)	(-)